

La **nueva**
perspectiva
en **máxima**
protección



Betanal[®]
maxxPro[®]



**Experimente el
nuevo referente en
el control de malezas
en remolacha**

- **Óptima seguridad al cultivo**
- **Máxima conveniencia**

**Rendimiento
excepcional basado
en 40 años de
experiencia de la
familia Betanal[®]**



Bayer CropScience
Si es Bayer, es bueno.


Betanal[®] maxxPro[®]

CARACTERÍSTICAS

Betanal[®] maxxPro 209 OD es un herbicida de contacto, efecto translaminar y además con una leve acción residual aportada por Lenacilo, para el control post emergente de malezas de hoja ancha en remolacha azucarera.

La tecnología de la formulación de **Betanal[®] maxxPro 209 OD** otorga una mayor estabilidad y mejor homogeneidad de la solución de aspersión. **Betanal[®] maxxPro 209 OD** controla malezas de hoja ancha, produciendo decoloración, luego clorosis y finalmente su muerte. **Betanal[®] maxxPro 209 OD** se aplica de post-emergencia en remolacha azucarera.

Debido a la innovación en tecnología de la formulación OD, **Betanal[®] maxxPro 209 OD** presenta una alta calidad de formulación y de mezcla de aspersión, junto con mayor seguridad para el medio ambiente y adecuada eficacia y fitocompatibilidad.



TECNOLOGIA DOBLE-A

- Nueva Tecnología de Formulación **Avanzada**
- Nueva tecnología de **Activación**

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación aérea y terrestre

Cultivo	Malezas	Dosis (L/ha)	Observaciones
Remolacha azucarera.	Sanguinaria, Tomatillo, Bledo, Duraznillo, Galinsoga, Porotillo, Quingüilla, Rábano, Chamico, Ambrosia y Malvilla.	1,5	Betanal[®] maxxPro 209 OD debe aplicarse cuando las malezas estén pequeñas, desde el estado de punto verde a cotiledones. En aplicaciones terrestres considerar volumen mínimo de 200 litros de agua/ha. Se realizan 3 a 4 aplicaciones por temporada, en forma consecutiva cada 7 a 12 días, dependiendo del desarrollo de las malezas. En aplicaciones aéreas, considerar volumen de agua mínimo de 60 litros/ ha.

Período de carencia para Chile: Remolacha azucarera: 90 días.


Instrucciones especiales: En días de alta luminosidad y alta temperatura (> a 25°C), se recomienda aplicar durante las últimas horas de la tarde, o bien, durante la noche. Al predominar malezas gramíneas, agregar un graminicida selectivo de post-emergencia.



Sanguinaria




Tomatillo




Bledo



Duraznillo



Quingüilla



Ambrosia



Malvilla



ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 23 3728 Coquimbo
(73) 21 3748 Linares

www.bayercropscience.cl

