



**EL HERBICIDA
DE CONTACTO
VERSÁTIL**

Prodigio



■ CARACTERÍSTICAS


Prodigio 600 SC es un herbicida de contacto y suelo activo, que se aplica en post - emergencia temprana de las malezas, y que se encuentra especialmente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha. En Ajos aplicar en post - emergencia temprana y en Cebollas a partir de los 10 días post - transplante, pudiendo ir en mezcla con otros herbicidas para ampliar su espectro de acción, tales como Raft. En Maravilla, se aplica en post - emergencia temprana de malezas, cuando el cultivo se encuentra entre 2 y 4 hojas verdaderas. En Papas aplicar desde inmediatamente después de la plantación hasta 5 - 7 días antes de la emergencia de las Papas.

■ MODO DE ACCIÓN

Prodigio se aplica sobre las malezas en activo crecimiento, inhibiendo las síntesis de pigmentos e indirectamente la fotosíntesis. Detiene el crecimiento de las malezas dentro de las primeras 48 horas de aplicado. Sin embargo, los síntomas de control como clorosis y muerte, se producen no antes de una semana después de la aplicación.

■ FORMULACIÓN

Prodigio contiene 600 g / L de Aclonifen, ingrediente activo perteneciente al grupo químico de los difeniléteres, y está formulado como suspensión concentrada (SC), la que es fácil de dosificar. Posee como ventaja una adecuada capacidad de mezcla (miscibilidad) con otros herbicidas, lo que es muy necesario en programas de control de malezas en ajos y cebollas.



■ ESPECTRO DE ACCIÓN


Prodigio controla malezas anuales principalmente de hoja ancha, como Quingüilla, Bledo, Malvilla y Rábano, entre otras, en sus primeros estados de desarrollo, entre cotiledones y primer par de hojas verdaderas.



A DE CONTACTO VERSÁTIL

▪ ÉPOCA DE APLICACIÓN

Prodigio se puede incluir en Programas de Manejo de Malezas desde los 10 días de la plantación en Cebollas y entre 2 y 4 hojas de la Maravilla. Prefiera el uso de diferentes herbicidas en forma integrada, alternando y mezclando diferentes ingredientes activos para lograr un control exitoso de malezas.



Prodigio

VENTAJAS

- Controla malezas difíciles como Rábano y Malvilla en sus primeros estados de desarrollo.
- Uso en post - emergencia temprana, complementando su Programa de Control de Malezas.
- Adecuada selectividad en: Cebollas, Ajos, Maravilla y Papas.
- Excelente acompañante en mezcla con otros herbicidas, como Raft.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Malezas	Dosis (L / ha)	Observaciones
Cebollas.		1,5	Aplicar desde los 10 días post-transplante, con malezas en activo crecimiento y desarrollo, desde que éstas se encuentran en etapa de cotiledón hasta 2 hojas verdaderas. Dependiendo del desarrollo de las malezas, realizar máximo tres aplicaciones durante la temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 - 15 días. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha.
Maravilla.		1,5	Aplicar en post-emergencia temprana, desde que la maravilla tenga 2 hojas verdaderas. Aplicar con malezas desde cotiledón a 2 hojas verdaderas. Realizar máximo una aplicación durante la temporada. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha.
Ajos.		1,5	Aplicar en post-emergencia del cultivo, cuando las malezas se encuentren entre cotiledón y 2 hojas verdaderas. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días, o cuando se produzca una nueva emergencia de las malezas.
Papas.	Bledo, Quingúilla, Chamico, Rábano, Verdolaga,	2 - 3	Aplicar desde inmediatamente después de la plantación, hasta 5 a 7 días antes de la emergencia de las papas. Utilice la dosis baja cuando se aplique en mezcla con otros herbicidas, cuando exista un porcentaje inferior a 2 % de materia orgánica y baja presión de malezas. En caso contrario considerar la dosis mayor. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha. Realizar máximo una aplicación durante la temporada.
Arvejas y Habas.	Malvilla, Ortiga y Chinilla, Quilloi-quilloi, Cardamine, Sanguinaria, Yuyo, Galinsoga, Bolsita del pastor.	1,5 - 2	Aplicar en pre-emergencia del cultivo, desde la siembra hasta 5 días después de esta. Considerar el uso de la dosis menor en suelos con menos de 3 % de materia orgánica o textura franco arenosa o cuando se aplique en mezcla con otro herbicida suelo-activo. En suelos con más de 3 % de materia orgánica, utilizar la dosis mayor. Es necesario lograr un muy buen mojado y cubrimiento del suelo, utilizando 200 a 250 L de agua/ha.
		2 - 3	Realizar la aplicación en pre-emergencia del cultivo, desde la siembra hasta 5 días después de esta. Considerar el uso de la dosis menor en suelos con menos de 6 % de materia orgánica. En suelos con más de 6 % de materia orgánica, utilizar la dosis mayor. Es necesario lograr un muy buen mojado y cubrimiento del suelo, utilizando 200 a 250 L de agua/ha.
Zanahoria.		1,5 - 2	Realizar la aplicación en pre-emergencia del cultivo, desde la siembra hasta 5 días después de esta. Considerar el uso de la dosis menor en suelos con materia orgánica inferior al 3 %. Utilizar la mayor de las dosis en suelos con más de 3 % de materia orgánica. Es necesario lograr un muy buen mojado y cubrimiento del suelo, utilizando 200 a 250 L de agua/ha.
		2 - 3	Realizar la aplicación en pre-emergencia del cultivo, desde la siembra hasta 5 días después de esta. Considerar el uso de la dosis menor en suelos con menos de 6 % de materia orgánica. En suelos con más de 6 % de materia orgánica, utilizar la dosis mayor. Es necesario lograr un muy buen mojado y cubrimiento del suelo, utilizando 200 a 250 L de agua/ha.
		1,5	Realizar la aplicación en post-emergencia del cultivo, cuando estas presenten un desarrollo de 2 a 3 hojas desplegadas. No aplicar cuando el cultivo se encuentre en el estado de cotiledones. Para lograr un buen control de las malezas, estas deben encontrarse en estado de cotiledón a dos hojas verdaderas. Es necesario lograr un muy buen mojado y cubrimiento de las malezas, utilizando 200 a 250 L de agua/ha.

Importante: Aplicaciones en estados de menor desarrollo de las malezas incrementan su eficacia.



ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

Fonos: (2)2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl

