

Programa Fitosanitario Carozos

CARROZOS



//// Science for a **better life**

CAROZOS



INSECTICIDAS

Admiral®
Escama de San José

Confidor FORTE
Pulgón verde del duraznero,
Chanchitos blancos

caLypso
Pulgón verde del duraznero

DiPel

Polillas, Enrolladores, Gusanos de los penachos

MOVENTO

Escama de San José, Pulgón verde del duraznero,
Chanchitos blancos

Confidor FORTE
Chanchitos blancos

caLypso

Polilla oriental de la fruta

enviador

Araña roja europea, Araña bimaiculada,
Falsa araña roja de la vid



FUNGICIDAS

agr copper
soluble powder

Cáncer bacterial, Tiro de munición, Cloca

Luna EXPERIENCE

Tizón de la flor, Botrytis cinerea, Oídio, Monilia

Pomarsol FORTE

Cloca del duraznero, Tiro de munición, Monilia

MYSTIC

CONSIST FULL

Tizón de la flor (Botritis - Monilia), Oídio

Horizon

CONSIST FULL

Oídio del duraznero

TELDOR 50 WP

TELDOR 500 SC

Botritis

TIEBREAK

Tizón de la Flor (*Monilinia Fructicola*), Penicillium

SERENADE

Cáncer bacterial, Tizón de la Flor (Botritis - Monilia)

Horizon

Geotrichum, Botritis



HERBICIDAS

Alion

Malezas anuales gramíneas y de hoja ancha. Malezas bianuales en etapa de germinación y perennes provenientes de semilla

Hache Uno® 2000 175 EC
Malezas gramíneas

CAROZOS

Recomendaciones de uso

CONTROL DE PLAGAS



Producto	Plaga	Dosis o Concentración
Admiral 10 EC	Escama de San José	50 a 70 cc / hL (1,0 - 1,5 L / ha)
Calypso 480 SC	Polilla oriental de la fruta, Pulgón verde del duraznero	20 cc / hL de agua (mínimo 300 cc / ha)
Confidor Forte 200 SL	Chanchitos blancos Pulgón verde del duraznero Langostinos	80 - 100 cc / hL de agua 30 - 50 cc / hL de agua 20 cc / hL de agua
Dipel WG	Polillas, Enrolladores, Gusanos de los penachos	500 - 1000 g / ha
Envidor 240 SC	Arañita roja europea, Arañita bimaculada, Falsa arañita roja de la vid	50 - 60 cc / hL de agua
Movento 100 SC	Escama de San José, Pulgón verde del duraznero, Chanchitos blancos	100 cc / hL de agua



CONTROL DE ENFERMEDADES

Producto	Enfermedad	Dosis o concentración
Agrocopper sp	Cáncer bacterial	60 - 120 g / hL
	Tiro de munición, Cloca	30 - 60 g / hL
Consist Full 75 % WG	Oídio	20 g / hL de agua
	Tizón de la flor (Monilia - Botritis)	30 - 40 g / hL de agua
Horizon 25 % WP	Oídio	40 - 60 g / hL de agua
	Botritis, Geotrichum	120 g / hL de agua
Luna Experience 400 SC	Tizón de la flor, Botrytis cinerea, Oídio, Monilia	40 a 50 cc / hL, ó 600 a 750 cc / ha
Mystic 520 SC	Tizón de la flor, Oídio	40 cc / hL de agua (600 cc / ha)
Pomarsol Forte 80 % WG	Cloca del duraznero, Tiro de munición, Tizón de la flor	200 - 250 g / hL de agua
Serenade ASO	Cáncer bacterial	8 L / ha
	Tizón de la Flor (Botritis - Monilia)	6 - 8 L / ha
Teldor 50 % WP	Botritis floración y/o pre-cosecha	80 g / hL de agua (1,6 kg / ha)
	Botritis post-cosecha	180 g / hL de agua
Teldor 500 SC	Botritis floración y/o pre-cosecha	80 g / hL de agua (1,6 kg / ha)
	Botritis post-cosecha	180 g / hL de agua
Tie Break 416,7 SC	Tizón de la Flor (<i>Monilinia</i>), <i>Penicillium</i>	1,2 L / ha mínimo



CONTROL DE MALEZAS

Producto	Problemas	Dosis
Alion 500 SC	Malezas anuales gramíneas y de hoja ancha Malezas bianuales en etapa de germinación Malezas perennes provenientes de semillas	0,15 - 0,2 L / ha
Hache Uno 2000 175 EC*	Malezas gramíneas anuales y perennes	0,75 - 4 L / ha

* Aplicar en mezcla con Induce pH a 100 - 200 cc / hL.
hL: hectólitro o 100 L de agua

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



Science for a better life