










Por esto y más **Antracol[®]**
**Su mejor opción en
prevención**

sólo o en
mezcla



Antracol[®]
Zinc⁺⁺

NUEVA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO ANTIRERESISTENCIA

-  Fungicida de amplio espectro.
-  Aporta Zinc a los cultivos.
-  Alta eficacia biológica.
-  Excelente formulación en polvo.
-  Muy buena compatibilidad con otros productos.
-  Contiene Finas partículas que evitan el tapado de boquillas.
-  Mejor desarrollo de la planta.

Además de prevenir enfermedades, Antracol[®] es una forma complementaria de suministrar Zinc vía foliar ya que así es asimilado rápidamente por la planta con excelente fitocompatibilidad.

Antracol[®]

Zinc⁺⁺

Características

Antracol[®] 70% WP es un fungicida foliar de acción preventiva, que se debe aplicar antes que aparezcan los síntomas y signos de las enfermedades. Tiene actividad de contacto multisitio, acción que minimiza la aparición de cepas resistentes. Especialmente recomendado para el control de enfermedades en hortalizas y papas, de acuerdo a la información presente en el cuadro de instrucciones de uso.

Formulación

Propineb 700 g / kg
 Polvo Mojable (WP)

Recomendaciones de uso

Especie	Enfermedad	Dosis / Concentración	Observaciones
Tomates.	Podredumbre mohosa de los frutos.	2 - 2,5 kg/ha. (500 - 600 g/100 L de agua)	Aplicar en forma preventiva, de preferencia a inicio de temporada, a intervalos de 7 a 10 días. Aplicarlo por concentración durante el desarrollo del cultivo y por dosis por hectárea con la máxima expresión vegetativa del cultivo a tratar. Considerar volumen de aplicación mínimo de 400 L de agua/ha.* Utilizar la dosis menor en aplicaciones preventivas, y la dosis mayor cuando existan condiciones predisponentes para el desarrollo de las enfermedades. Contemplar máximo tres aplicaciones durante la temporada.
Papas.	Tizón tardío.		
Cebollas.	Mildiú.		

* Se sugiere utilizar **Induce[®] pH 900 SL**, de acuerdo a las instrucciones presentes en su etiqueta.

Periodo de carencia para Chile: Papas y tomates: 2 días. Cebollas: 9 días.



ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
 (51) 223 3728 Coquimbo
 (73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl

