



VERANGO[®]
PRIME

Sé parte de la Evolución.

- // *Excelente Control de nemátodos a bajas dosis.*
- // *Solución de última generación para la protección de la raíz - Fácil y Segura.*
- // *Perfil de seguridad para la agricultura sustentable.*
- // *Amigable con el suelo y organismos benéficos - efecto frontal contra nemátodos*
- // *Flexibles técnicas de aplicación pre o post trasplante.*
- // *Reduce costos operacionales.*






VERANGO
PRIME

Movilidad en el suelo

Valores analíticos (cromatografía): Recuperación por profundidad de suelo

VERANGO PRIME muestra una movilidad diferente a otros productos estándares en el suelo.



Recuperación de los productos aplicados (%)

Tipo de suelo ligeramente arenoso: arena 74.2%, arcilla 5%, limo 20.8%, humus 2.35%

Instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha) / Concentración (ml/hL)	Observaciones
Papas	Nemátodo dorado de la papa (<i>Globodera rostochiensis</i>).	0,75	Aplicar mediante equipos de aspersión incorporados en la plantadora en el momento de la plantación de las papas, dirigiendo las boquillas de manera de mojar el tubérculo-semilla y el fondo del surco. En ausencia de este equipo aplicar sobre tubérculos ya plantados, antes de cerrar el surco. Considerar un volumen de aplicación de 100 a 200 L de agua/ha. Realizar máximo 1 aplicación durante la temporada.
Tomate	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne ethiopica</i> ; <i>M. arenaria</i> ; <i>M.javanica</i> , <i>M.hapla</i>).	0,5 L/ha* 1,0 L/ha	Dosis 1,0 L/ha: Realizar 1 aplicación al inicio del cultivo, en el riego previo al trasplante o en el primer riego pos trasplante (7 - 10 días después de la plantación); *Dosis 0,5 L/ha: Realizar obligatoriamente 2 aplicaciones: la primera aplicación previo al trasplante y la segunda 14 - 28 días después. En suelos arenosos, preferir la aplicación parcializada. Realizar la aplicación a través del sistema de riego por goteo, en el segundo tercio de Riego, por ejemplo: para un riego de 1 hora, primero regar 20 minutos - luego aplicar el producto en los 20 minutos siguientes - finalmente regar hasta el término del periodo de riego, de manera de lograr una mayor distribución del producto en el perfil del suelo. Para más detalles de cómo efectuar la aplicación, consultar a nuestro departamento técnico o representantes zonales. Realizar máximo una aplicación de 1 L/ha o 2 aplicaciones de 0,5 L/ha durante la temporada.



Bayer

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO